

Canesten®

(klotrimazol)


sedaj vse oblike

BRp


Spoštovani,

obveščamo vas, da je JAZMP (Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke) odobrila preklon zdravila **Canesten®** (vse ginekološke oblike) z režima predpisovanja na recept (Rp) na režim predpisovanja oziroma izdajanja **brez recepta** (BRp). Tako so sedaj vse oblike zdravila **Canesten®** (dermalne in ginekološke) na voljo v prosti prodaji kot tudi na recept (pozitivna lista).

S tem smo omogočili, da vsem bolnikom, ki potrebujejo zdravilo **Canesten®** (dermalne in ginekološke oblike), ni več potrebno vsakokrat obiskati osebnega zdravnika ali ginekologa.



mag. Petra Molan, mag. farm.
Generalna direktorica Bayer d.o.o.



Maja Frelih, mag. farm.
Produktni vodja Canesten®



NAVODILO ZA UPORABO

Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolj koristilo.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je zdravilo Canesten krema in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Canesten krema
3. Kako uporabljati zdravilo Canesten krema
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Canesten krema

Canesten® krema

clotrimazolum

Zdravilna učinkovina je klotrimazol.

Pomožne snovi so:

benzilalkohol, cetilpalmitat, cetil in stearylalkohol, oktildodekanol, polisorbitat 60, sorbitan stearat, prečiščena voda

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom: Bayer d. o. o., Bravničarjeva 13, 1000 Ljubljana

Izdelaovalec: Bayer HealthCare AG, 51368 Leverkusen, Nemčija ali Kern Pharma S.L., 08228 Terrassa (Barcelona), Španija

1. KAJ JE ZDRAVILO CANESTEN KREMA IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Zdravilo Canesten krema je na voljo v škatli z 1 tubo po 15 g ali 20 g kreme.

1 g kreme vsebuje 10 mg klotrimazola.

Klotrimazol, učinkovina Canestena, je imidazolov derivat s širokim spektrom protimikoznega delovanja.

Klotrimazol deluje na glivice tako, da zavira nastajanje ergosterola. Posledica tega so strukturne in funkcionalne okvare citoplazemske membrane.

Kremo Canesten uporabljamo za zdravljenje glivičnih okužb, ki jih povzročajo dermatofiti, kvasovke, plesni idr. mikroorganizmi.

Take okužbe so: tinea pedum (glivična okužba stopal), tinea manuum (glivična okužba rok), tinea corporis, tinea inguinalis (glivična okužba kože trupa in udov ter

kožnih gub), pyitriasis versicolor (okužba rožene plasti kože), eritrazma, (blago, kronično, površinsko vnetje kože).

Kremo Canesten uporabljamo tudi za zdravljenje okužb sramnih ustnic in mejnega predela ter vnetja glavice in kožice moškega uda, ki so ga povzročile kvasovke (kandidni vulvitis in kandidni balanitis).

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE UPORABILI ZDRAVILO CANESTEN KREMA

Ne uporabljajte zdravila Canesten krema:

- če ste preobčutljivi za klotrimazol, cetil in stearylalkohol ali katerokoli sestavino zdravila Canesten krema. V tem primeru se pred uporabo zdravila posvetujte z zdravnikom. V primerih znane preobčutljivosti za cetil in stearylalkohol je priporočljivo, da namesto kreme Canesten uporabljate raztopino ali raztopino v dermalnem pršilu.
- Pri kandidnem vulvitisu in kandidnem balanitisu uporaba raztopine ni dovoljena.

Bodite posebno pozorni pri uporabi zdravila Canesten krema:

- Canesten krema lahko zmanjša učinkovitost in varnost izdelkov iz lateksa (kondomi, diafragme), ko se nanese na območje genitalij (ženske: sramne ustnice in območje vulve; moški: glavica in kožica moškega uda). Ta učinek je kratkotrajen in po koncu zdravljenja izgine.

Nosečnost

Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.

Če kremo Canesten uporabljate, kot je predpisano v navodilu ali kot vam je naročil zdravnik ali farmacevt, pojav sistemskih učinkov (učinkov na druge organe) ni verjeten, ker se klotrimazol ne absorbira skozi nepoškodovano ali vneto področje kože v krvni obtok. Kljub temu je njegova uporaba v prvih treh mesecih nosečnosti primerna le, če tako svetuje zdravnik. Raziskav o uporabi kreme Canesten med nosečnostjo še ni.

Dojenje

Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.

Doječe matere naj kreme Canesten ne nanašajo na dojke.

3. KAKO UPORABLJATI ZDRAVILO CANESTEN KREMA

Zdravilo morate uporabljati tako, kot je predpisano v tem navodilu (razen če vam je zdravnik predpisal drugače). Če navodil ne boste natančno upoštevali, zdravilo ne bo pravilno delovalo.

Dva- do trikrat na dan nanesite na prizadete dele kože tanek sloj kreme Canesten in jo previdno vtrite. Največkrat zadostuje majhna količina kreme (1/2 cm) za površino, veliko kot dlan. Prizadeto mesto pred nanosom kreme temeljito umijte in posušite.

Trajanje zdravljenja je različno in odvisno od obsega in lokalizacije bolezni. Za popolno ozdravitev zdravljenja ne smete končati takoj, ko izginejo simptomi okužbe.

Ponovitev bolezni preprečite tako, da zdravljenje nadaljujete še dva tedna potem, ko so izginili vsi bolezenski znaki.

Simptomi običajno izginejo, če traja zdravljenje:

dermatomikoze	3 do 4 tedne
eritrazme	2 do 4 tedne
pityriasis versicolor	1 do 3 tedne
kandidnega vulvitisa in kandidnega balanitisa	1 do 2 tedna.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila Canesten krema, kot bi smeli:

Podatkov, da bi uporaba prevelike količine kreme Canesten povzročila neželene učinke, ni.

Če ste pozabili uporabiti zdravilo Canesten krema:

Če ste pozabili na odmerek zdravila, naj naslednji odmerek zato ne bo večji.

Učinki, ko prenehate uporabljati zdravilo Canesten krema:

Če želite glivično okužbo popolnoma pozdraviti in preprečiti njeno ponovitev, zdravljenja ne smete končati brez posvetovanja z zdravnikom. Če se za to vseeno odločite, tvegate, da se bo bolezen ponovila. Zdravljenja ne smete končati takoj, ko izginejo simptomi okužbe, ampak ga morate nadaljevati, kot je predpisano v tem navodilu.

Kaj še lahko naredite za zdravljenje okužbe?

Perilo, oblačila in brisače, ki pridejo v stik s prizadetim delom, je treba zamenjati vsak dan. To bo pomagalo pri zdravljenju in preprečilo okužbo drugih delov telesa in drugih ljudi.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila, ima lahko tudi zdravilo Canesten krema neželene učinke.

Pojavijo se lahko preobčutljivostne reakcije, bolečina, srbenje in kožni izpuščaji.

Če se naštetih neželenih učinkov pojavijo prvič ali če se stanje poslabša, kremo Canesten prenehajte uporabljati in se posvetujte z zdravnikom.

Če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA CANESTEN KREMA

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini.

Način izdajanja zdravila:

Zdravilo se izdaja brez recepta v lekarnah.

Navodilo je bilo odobreno: 17.9.2007